**Von Pontius zu Pilatus:
Lücken und Schnittstellenprobleme in der
medizinischen und pflegerischen Versorgung von
Menschen mit Demenz**

**-
aktuelle Herausforderungen und innovative
Antworten**

Vernetzungstreffen „Brücken bauen“, Potsdam, 6.12.2019

Wovon reden wir!

Evangelium nach Lukas 23,7ff

Einleitende Worte

Evangelium nach Lukas 23,7ff

Hintergrund – was wir wissen!

Was lernen wir daraus?

- Analogien sind immer kritisch, weil vielschichtig (Verurteilung/ Kreuzigung Jesu – Schnittstellenproblematik für von Demenz betroffene Personen... na ja!)
- Schnittstellenprobleme sind allgegenwärtig/ seit Jahrhunderten bekannt/ dokumentiert
- Selbst relativ klare Vorgaben führen im Einzelfall zu Irritationen/ Problemen
 - Verurteilung nach jüdischem Recht/ Vollstreckung nach römischem Recht...
 - „Motivation“ von Pontius Pilatus
 - Unklare Zuständigkeit innerhalb des Römischen Reiches (Pilatus oder Herodes) (Tatort vs. Wohnort)
- Es verlangt ein hohes Maß an Motivation/ Engagement zur Erreichung des Ziels/ Überwindung der Hürden

Hintergrund – was wir wissen!

Defizite in der Regelversorgung

- Symptomatische Menschen mit Demenz werden zu spät identifiziert → fehlende Möglichkeit Symptome adäquat zu behandeln
- Pharmakotherapie (sehr häufig auch der vorliegenden Begleiterkrankungen) ist nicht adäquat → Fehlbehandlungen
- regionales Versorgungs- und Unterstützungssystem wird nicht genutzt → erhöhte Kosten/ Aufwand, wenn „zu spät“ genutzt
- Keine systematische Koordinierung der verschiedenen Leistungserbringer → Betroffene überfordert, fehlende Synergien der verschiedenen Anbieter
- Angehörige bleiben außen vor → Angehörige tragen die Hauptlast, möglichst frühzeitige, effektive Unterstützung stabilisiert die häusliche Situation → Verzögerung der Institutionalisierung
- Demenz ist komplexes Syndrom → fehlende Interprofessionalität der Behandlung/ Versorgung

Chance in der derzeitigen Regelversorgung

Vernetzung in der Versorgung von Menschen mit Demenz

Wir stehen nicht alleine da!

CHAPTER 2

The role of primary care in the dementia healthcare system 21

- Objectives and search strategy 21
- Search results, and characteristics of the eligible studies 21
- Framework for presentation of research findings on the role of primary care in dementia healthcare 27
- Detection and diagnosis 27
- Post-diagnostic care and support 34
- Continuing care 36
- Summary and discussion 39

CHAPTER 3

Care coordination and case management for people with dementia 46

- Objectives and search strategy 46
- Search results, and characteristics of the eligible studies 47
- What is the evidence to support case management (cost-) effectiveness? 47
- Implementation of case management 54
- Summary and discussion 55

Ein Beispiel: Diagnostik

Leitliniengerechte Diagnostik und Versorgung

Zerebrale Bildgebung

- *Aus der mangelnden diagnostischen Güte von klinischen Kriterien folgt, dass eine bildgebende Untersuchung des Gehirns im Rahmen einer ätiologischen Diagnostik einer Demenz durchgeführt werden soll, da sonst behandelbare Ursachen übersehen werden können. Entsprechend empfiehlt die überwiegende Anzahl der Leitlinien (z.B. NICE 2007, SIGN 2006) eine bildgebende Untersuchung des Gehirns bei der diagnostischen Zuordnung einer Demenz.“ (S3-Leitlinie Seite 46, 47)*

21 Bei bestehendem Demenzsyndrom soll eine konventionelle cCT oder cMRT zur Differenzialdiagnostik durchgeführt werden.

Empfehlungsgrad A, Leitlinienadaptation NICE-SCIE 2007

Ein Beispiel: Diagnostik

Leitliniengerechte Diagnostik und Versorgung

Hausärztliche Versorgung

- Während in Demenzambulanzen und/oder Spezialisten-Sprechstunden eine selektionierte Patienten-population erwartet werden darf, welche häufig selbst oder auf Wunsch der Familie die Indikation zur erweiterten Diagnostik und Beratung gestellt hat, liegt die Prätestwahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Demenz in der Hausarztpraxis deutlich unter der solcher Einrichtungen, Besuche und Bitten um Beratungen sind seltener geplant. (S3-Leitlinie Seite 103)

2. Eine Demenzdiagnostik und -therapie kann auch allein in der Hausarztpraxis durchgeführt werden und erfordert nicht obligat die Überweisung zu Fachspezialisten.

Gerade die langjährige Kenntnis der Patientinnen und Patienten und ihres Umfeldes ermöglicht hier Einschätzungen, die über das hinausgehen, was Testbatterien zu bieten haben.

Was ist der Status?

DelpHi-Studie (Demenz: lebenswelt- und personenzentrierte Hilfen in MV)

Ziel:

Implementation und Evaluation von Dementia Care Management in der primärärztlichen Versorgung

Outcome:

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung an Demenz erkrankter Menschen

- Antidementive Medikation
- Lebensqualität
- Angehörigenbelastung

Design:

hausarzt-basierte, clusterrandomisierte, kontrollierte Interventionsstudie mit jährlichen Erhebungszeitpunkten

Methode – relevante Daten

Patientenakte des Hausarztes:

- Diagnosen
- Facharztbriefe

Strukturierte Interviews mit dem MmD zu Hause

- Inanspruchnahme von Hilfen
- Depressive Symptomatik; Geriatrische Depressionsskala, GDS
- Funktionsniveau; Bayer-ADL, Lebensqualität, QuolAD
- Medikationsreview
- ...

Patientenakte niedergelassener Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie

- Bildgebung (wenn vorhanden),
- Berichte an den Hausarzt

Strukturierte Interviews mit dem Angehörigen zu Hause

- ...

CONSORT

Wie häufig liegt eine formale Demenzdiagnose vor? Welche?

Ergebnis – das Sample (1):

Formale Diagnose

- 40% der positiv auf eine Demenz gescreenten Personen hatten eine formale Demenzdiagnose

Differentialdiagnose

Assoziierte Faktoren

- Eine fehlende Diagnose hängt signifikant mit geringerer , kognitiver Einschränkung zusammen (höherer MMSE; OR, 1.11; $p < .05$, 95% CI 1.04-1.18)

Was sind die Charakteristika von Menschen mit V.a. eine Demenz, die einen Facharzt für Neurologie in Anspruch nehmen im Vergleich zu denen, die dies nicht tun ?

Ergebnis – das Sample (nach Geschlecht):

Characteristics of people with dementia in primary care by sex and whether they utilized a specialist in residency or not prior to the assessment

variable	label	valid data (n)	Total sample (n=485)		Male (n=199)		Female (n=286)		
			n/mean	SD/%	n/mean	SD/%	n/mean	SD/%	
age	years	485	80	5.52	78.4	5.19	81.1	5.49	<i>P</i> < 0.001
sex	female	485	286	59.0%	199	40.0%	286	59.0%	
partnership								32.5%	<i>P</i> < 0.001
cognitive status								5.46	<i>P</i> = 0.006
functional impairment								2.66	<i>p</i> = 0.02
depression								2.45	<i>p</i> = 0.621
formal diagnosis of dementia								38.5%	<i>p</i> = 0.588
utilization of specialist	yes							76.6%	<i>p</i> = 0.193
	self-report-yes	466	123	26.4%	66	33.2%	57	15.7%	<i>p</i> = 0.074
								19.9%	<i>p</i> = 0.002

- Laut Patientenakte haben 18,4% der positiv auf Demenz gescreenten Personen einen Facharzt für Neurologie/ Psychiatrie besucht.
- In der Selbstauskunft geben 26,4% an einen Facharzt aufgesucht haben und hier gibt es einen Geschlechtereffekt

MMSE, Mini-Mental State Examination; range 0–30; higher score indicates better cognitive functioning; B-ADL, Bayer Activities of Daily Living Scale; range 0–10; lower score indicates better performance; GDS, Geriatric Depression Scale, sum score 0–15; higher scores indicate more depressive symptoms, *p*-value based on Fisher’s exact test and Welch’s *t*-test.

Ergebnis – das Sample (2)

Characteristics of people with dementia in primary care by whether they utilized a specialist in residency or not prior to the assessment

variable	label	valid data (n)	Total sample (n = 485)		GP-only (n = 396)		GP+Specialist (n = 89)		p-value
			n/mean	SD/%	n/mean	SD/%	n/mean	SD/%	
age	years	485	80	5.52	80.26	5.57	78.83	5.16	p = 0.022
sex	female							50.6%	p = 0.074
partnership	yes							60.7%	p = 0.024
cognitive status	MMSE							5.24	p = 0.24
functional impairment	B-ADL							2.54	p = 0.068
depression	GDS							1.91	p = 0.51
formal diagnosis of dementia	prior							42.7%	p = 0.5
utilization of specialist	at baseline							89.02%	p = 0.04
	self-report-yes	466	123	26.4%	85	22.2%	38	45.8%	p < 0.001

• Positiv auf Demenz gescreente Menschen, die einen Facharzt für Neurologie und Psychiatrie besucht haben unterscheiden sich im Alter (*eher jünger*), dem Beziehungsstatus (*eher in Partnerschaft*) und dem Vorliegen einer formalen Diagnose (*eher ja*) von Menschen, die keinen Besuch in der Patientenakte dokumentiert hatten.

MMSE, Mini-Mental State Examination; range 0–30; higher score indicates better cognitive functioning; B-ADL, Bayer Activities of Daily Living Scale; range 0–10; lower score indicates better performance; GDS, Geriatric Depression Scale, sum score 0–15; higher scores indicate more depressive symptoms, p-value based on Fisher’s exact test and Welch’s t-test.

Welche probandenbezogenen Faktoren sind mit der Inanspruchnahme eines Facharztes für Neurologie assoziiert?

Ergebnis – assoziierte Faktoren Inanspruchnahme

Factors associated with utilization of specialist by PWD in primary care

	OR	<i>p</i>	95% CI	
Age (years)	0.95	0.04	0.90	0.99
Sex (female)	0.90	0.70	0.53	1.54
Living in partnership (yes)	1.28	0.37	0.74	2.22
Cognitive impairment (MMSE)	0.99	0.87	0.95	1.05
Formal diagnosis of dementia at baseline	1.55	0.17	0.83	2.86
Depression (GDS-score)	0.93	0.20	0.83	1.04
Functional impairment (B-ADL)	1.15	0.02	1.02	1.30

Logistic regression analysis (with = 446 patients; $R^2 = 0.062$): OR, odds ratio; CI, confidence interval; MMSE, Mini-Mental State Examination; range 0–30; higher score indicates better cognitive functioning; B-ADL, Bayer Activities of Daily Living Scale; range 0–10; lower score indicates better performance; GDS, Geriatric Depression Scale, sum score 0–15; higher scores indicate more depressive symptoms.

- Der Besuch bei einem Facharzt für Neurologie/ Psychiatrie ist assoziiert mit dem Alter (*die Wahrscheinlichkeit sinkt mit dem Alter*) und der funktionalen Beeinträchtigung (*die Wahrscheinlichkeit steigt mit der funktionalen Beeinträchtigung*)

Wie häufig werden bildgebende Verfahren bei Menschen eingesetzt?

Ergebnis – Bildgebung

• 85% der Patienten erhielten beim Facharzt eine bildgebende Diagnostik

Wie kann man das (über die Diagnostik hinaus) optimieren?

Beispiel: Dementia Care Management

Hausbesuche von speziell qualifizierten Pflegefachpersonen

IT-gestützte Identifikation von Versorgungslücken auf
ärztlicher, pflegerischer, medikamentöser, psycho-sozialer und
sozialrechtlicher Ebene

&

Erstellung des **individualisierten** Behandlungs- und
Versorgungsplanes

Umsetzung des Versorgungsplanes mit **Hausärzten (Delegation**
hausärztlicher Leistungen; **Monitoring** und **Ergebniskontrolle)**

Eichler et al. Int Psychogeriatrics, 2014, Thyrian et al. JAMA Psychiatry, Michalowsky et al. Alz & Dement 2019

Beispiel: Demenznetzwerke

Proof of concept: IDEMUCK

- **Ziel:** Schließung der Forschungslücke bezüglich der Wirksamkeit regionaler Demenznetzwerke
- **Demenznetz Uckermark:** Verbesserung der Versorgung durch integrative klinische Behandlungspfade über die Sektorengrenzen hinweg
 - Hausärzte, Fachärzte, Sozialarbeiter
 - Krankenhäuser, Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege, Heilmittelversorgung

Ergebnis: Netzwerknutzer nahmen signifikant häufiger einen **Neurologen/ Psychiater** (18.6% vs. 2.8%; $p < 0.001$) in Anspruch und nahmen **häufiger Antidementiva** ein (50.5% vs. 35.8%; $p = 0.035$), d.h. **wurden häufiger leitliniengerecht Versorgung**

Köhler L, Meinke-Franze C, Hein J, Fendrich K, Heymann R, Thyrian JR, Hoffmann W, Does an Interdisciplinary Network Improve Dementia Care? Results from the IDemUck-Study. *Current Alzheimer Research*. 2014; 11(6):538-48..

Determinanten erfolgreicher Netzwerke

Gesundheitsökonomie

- (Finanzielle) Erfolgsfaktoren nachhaltiger Netzwerke

Netzwerkmaterialien

- Sammlung sämtlicher in den Netzwerken genutzter Dokumente

Governance

- Netzwerkstrukturen und Steuerung von Netzwerken

Versorgung

- Patienten in Netzwerkstrukturen waren besser versorgt (erhielten häufiger eine „leitliniengerechte Versorgung“)

Angehörigenbelastung

- Angehörige zeigten geringe Belastung

Wissenstransfer

- Generierung und Weitergabe von Wissen

Umsetzung (Winter 2017)

DemNet-D ist referenziert im §45c Absatz 9 SGB XI “Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen” (Pflegestärkungsgesetz II)

- Finanzielle Förderung von Gesundheitsnetzwerke mit jährlich bis zu 20.000 Euro je Kreis zu unterstützen

Erhalten Sie Zuwendungen aus dem §45c Abs. 9 SGB XI?

Haben Sie versucht eine Förderung zu erhalten?

Ergebnisse aus einer **zusätzlichen Befragung von n=119 Netzwerken**

Seitdem:

Die BAGSO

Unter dem Dach der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) haben sich über 100 Verbände mit vielen Millionen älteren Menschen zusammengeschlossen. Die Netzwerkstelle „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ will die Teilhabe von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen stärken und für den Umgang mit Demenz sensibilisieren.

Gefördert vom:

Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Kontakt

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO)

Netzwerkstelle Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz
Thomas-Mann-Str. 2-4
53111 Bonn

Stefanie Adler (Projektleitung)
Telefon: 0228 / 24 99 93 – 33
E-Mail: adler@bagso.de

Silke Leicht (Projektreferentin)
Telefon: 0228 / 24 99 93 – 25
E-Mail: leicht@bagso.de

Nora Zorn (Sachbearbeitung)
Telefon: 0228 / 24 99 93 – 29
E-Mail: zorn@bagso.de

www.bagso.de
www.lokale-allianzen.de

Stand September 2018

Netzwerkstelle
Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz

Die BAGSO

Lobby der Älteren

GEMEINSAM NEUE WEGE GEHEN.

NETZWERKSTELLE Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz

Visual: Gestaltung: www.madine-hausdruck.com
Bildnachweis: Fotok. Innen: istockphoto.com | Fot. wv: Fotoblog: istockphoto.com | Da. View

Bericht der Allianz für Menschen mit Demenz

Handlungsfeld 4: Gestaltung des Unterstützungs- und Versorgungssystems:

- Zusammenarbeit der Leistungsanbieter
- Behandlungsleitlinien
- Kooperationsverträge für eine gute Versorgung
- Versorgung im Akutkrankenhaus (Konzepte, ambulant hat Vorrang)
- Pflegeberater
- Qualifizierung
- Reform der Pflegeausbildung

Nationale Demenzstrategie (seit 21.9.2019)

„Im Laufe des Jahres 2019 sollen bestehende Herausforderungen und Bedarfe für die Lebenssituation der Erkrankten und ihrer Angehörigen analysiert und konkrete Maßnahmen zu deren Verbesserung entwickelt werden. Die **Strategie soll Ende 2019 fertiggestellt** und **Anfang 2020 vom Bundeskabinett** beschlossen werden.“

Handlungsfeld 1: Strukturen zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Demenz an ihrem Lebensort aus- und aufbauen

Handlungsfeld 2: Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen unterstützen

Handlungsfeld 3: Medizinische und pflegerische Versorgung von Menschen mit Demenz weiterentwickeln:

Handlungsfeld 4: Exzellente Grundlagen- und Anwendungsforschung zu Demenz fördern

Aber warum sind Sie (und ich) heute hier?

NETZWERKSTELLE
Lokale Allianzen für
Menschen mit **Demenz**

Kompetenzzentrum
DEMENTZ
für das Land Brandenburg
in Trägerschaft der Alzheimer Gesellschaft
Brandenburg e.V.

EINLADUNG ZUM
VERNETZUNGSTREFFEN

AM 06.12.2019
10.00 – 16.00 UHR
IN POTSDAM

BRÜCKEN BAUEN
Mit lokalen Netzwerken die
Übergänge in der medizinischen
und pflegerischen Versorgung von
Menschen mit Demenz gestalten

Vernetzen

Brücken bauen

Gestalten

BITTE NEHMEN SIE IHR SMARTPHONE IN DIE HAND!

Gehen Sie in Ihren Browser und öffnen die Seite

www.menti.com

Tippen Sie folgenden Code ein:

84 15 12

DANKE FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT!

Wenn Sie Interesse haben am DZNE zu arbeiten (oder jemandem dies empfehlen wollen):

Kontakt in Greifswald:

rene.thyrian@dzne.de

@DZNE_Thyrian

Stellenangebote: www.dzne.de/jobs